

# COMBATIR LEPIDÓPTEROS CON LEPI SAN<sup>®</sup>



# LEPISAN<sup>®</sup> controla

## *Spodoptera exigua* (Rosquilla verde)



**Cultivos: Pimientos, tomate, sandía, melón, etc.**

## *Spodoptera littoralis* (Rosquilla negra)



**Cultivos: Alfalfa, maiz, pimiento, tomate, etc.**

## *Lobesia botrana* (Polilla del racimo)



**Cultivo: Vid.**

### ***Chilo suppressalis* (Barrenador del arroz)**



**Cultivo: Arroz.**

### ***Helicoverpa armigera* (Heliothis, oruga del tomate)**



**Cultivo: tomate, algodón, maíz, pimiento**

### ***Euzophera pingüis* (Agusanado del olivo)**



**Cultivo: olivo**

# La Trampa: LEPISAN®

- Indicada en programas de monitoreo y captura masiva.
- LEPISAN® es una trampa polillero diseñada para la captura de insectos lepidópteros (polillas), en cultivos hortícolas, vid, arroz, etc.
- LEPISAN® se ceba con un atrayente sexual de machos (feromona) y con un insecticida (vapon).



# Componentes de LEPISAN<sup>®</sup>

1. Reservorio de insectos (transparente), contenedor de cesta portainsecticida.
2. Cuerpo superior (verde) que acopla mediante giro con el reservorio.
3. Techo (verde) que encaja con el cuerpo superior, sobre el que se acopla la cesta portaferomona de la especie a capturar.
4. Cesta portaferomona y cesta portainsecticida (ambas con tapa).
5. Hilo colgador.

**FÁCIL MONTAJE  
(Sistema Click)**





# **Cómo utilizar LEPISAN<sup>®</sup>**

---

## **MONITOREO:**

### **- Aire libre:**

- Parcelas de <3 Ha: 3-4 trampas/parcela.
- Parcelas de > 3 Ha: 1-2 trampas/Ha.

### **- Invernadero:**

- 1 trampa/500 m<sup>2</sup>.

## **TRAMPEO MASIVO:**

### **- Aire libre:**

- 8-10 trampas/Ha uniformemente repartidas en la zona central de la parcela, considerando bordes.

### **-Invernadero:**

- 1 trampa /300-500 m<sup>2</sup> (mínimo de 2 trampas por invernadero).

# Instalación de LEPISAN<sup>®</sup>

- Ensamblar las diferentes piezas del polillero LEPISAN<sup>®</sup> y cebarlas con el atrayente específico del insecto que se quiere controlar y con el insecticida.
- Las trampas se colocan 20 cm por encima del cultivo (con un tutor).
- Instalarlas al inicio del cultivo y mantenerlas hasta la recolección.
- Renovar la feromona de acuerdo con las indicaciones de sus fabricantes.
- Retirar del campo el polillero al final de la campaña de campo.

**IMPORTANTE: UTILIZAR  
GUANTES PARA LA  
MANIPULACIÓN DE LA  
PASTILLA DE INSECTICIDA**





# **Atrayentes LEPISAN<sup>®</sup>**

---

- **El formato de estos difusores rubber-septa de feromonas especiales para monitoreo y captura masiva permite una difusión constante.**
- **Este emisor tiene una durabilidad aproximada de 30 días.**
- **Impregnado de la feromona específica permite el monitoreo y la captura masiva de las poblaciones de lepidópteros que son plaga en una gran variedad de cultivos.**
- **Los atrayentes LEPISAN<sup>®</sup> se colocan en la cesta portafерomona cerrada de manera conveniente.**



# **ADVERTENCIAS**

---



- **Conservar el producto en su envase original hasta el momento de su utilización. Conservar refrigerado, alejado alimentos y piensos. Mantener fuera del alcance de niños y animales.**
- **No ingerir.**
- **Después de su manipulación, lavarse abundantemente las manos con agua y jabón.**